Către,

Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții

Societăți agricole și persoane fizice care desfășoară activități agricole pe raza comunei

INFORMARE – AMBROZIA prezentare și combatere

Ambrosia artemisiifolia

Ce este ambrozia?

Ambrozia (*Ambrosia artemisiifolia*) este o buruiană invazivă originară din America de Nord. Aceasta creează probleme grave de sănătate deoarece polenul extrem de alergen parcurge distanțe foarte mari cu ajutorul curenților de aer. Simptomele alergiilor provocate de ambrozie sunt: **rinita alergică, conjunctivita alergică, astm bronșic** și mai rar dermatită de contact și reacții anafilactice, acestea putând să dureze chiar câteva luni pe an în perioada de înflorire a plantei. În luna februarie 2018, Parlamentul României a adoptat o lege care prevede obligativitatea combaterii ambroziei de către deținătorii de terenuri

Ambrozia - pericol pentru sănătate!

Cum combatem ambrozia?

- Pe suprafețe mici sau de-a lungul drumului se fac cosiri repetate (o singură cosire nu este suficientă), înainte de înflorire și pe toată perioada de vegetație pentru a împiedica înflorirea. La o densitate mică se smulge manual cu mănuși de protecție. Tăierea necorespunzătoare poate duce la ramificarea abundentă și creșterea cantității de polen și semințe produse
- În terenul arabil se vor efectua lucrări specifice de combatere a buruienilor în culturi (erbicidare – ex: Dicamba, Bromacil) și prelucrarea solului (arat) imediat după recoltare. Terenurile arabile necultivate trebuie cosite înainte de înflorirea speciei pentru a evita producerea de polen alergen și de semințe
- Evitarea transportării de sol, pietriș, mărfuri ș.a.m.d. din zonele invadate cu ambrozie, deoarece în acest fel se răspândesc semințele

Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice.

În România, ambrozia este răspândită în aproape toate zonele (cu excepția zonei dealurilor înalte și a zonei montane), preferând solurile nisipoase, mai puțin fertile, ușor alcaline.

Crește spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în principal de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, pe marginea apelor curgătoare, la marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute, dar și în grădini și parcuri neîngrijite), în zone unde s-a depozitat pământ excavat, în culturile de cereale şi de floarea-soarelui, producând pagube semnificative de recoltă.

În conformitate cu prevederile art. 1 alineatelor (1) – (3) din Legea nr. 62/2018 *privind combaterea buruienii ambrozia*, distrugerea acestei buruieni se face de către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, unde au fost identificate focare de infestare. Aceștia au obligația ca după distrugerea buruienii să informeze în scris autoritatea administrației publice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor de combatere.

Cum poate fi combătută /distrusă buruiana ambrozia ?

În majoritatea cazurilor buruiana este răspândită și ocupă spații/vetre compacte. Ca urmare, cele mai bune rezultate se pot obține prin cosirea manuală a acestor vetre sau prin folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba, în special pe alineamentele căilor ferate, a drumurilor și pe marginea parcelelor.

Atunci când buruiana este răspândită în interiorul tarlalelor/solelor agricole, în special în interiorul unor crovuri, stufărișuri, denivelări etc., distrugerea se poate face prin aplicarea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori mecanice. Este rezistentă la secetă și arșiță.

Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se pot aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme când buruiana are 10 – 15 cm și poate fi recunoscută cu ușurință.

În vederea stabilirii tipului de erbicid și a dozei, proprietarii/deținătorii/administratorii de terenuri pot apela la specialiștii direcțiilor pentru agricultură județene pentru a primi informații detaliate..

În cazul existenței unor focare izolate, buruiana poate fi smulsă relativ ușor folosind mănuși de protecție pentru evitarea iritațiilor, distrusă cu sapa sau prin secerare.

Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai eficiente, cositul mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape de suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpina principală. În caz contrar, se distruge doar tulpina principală iar restul ramificațiilor se dezvoltă, înfloresc și produc în continuare polen.

Se recomandă cositul repetat de 2 -3 ori pe an.

Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eradicarea completă a buruienii.

Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția inflorescențelor.

Având in vedere cele mai sus menționate, vă solicităm să luați măsurile ce se cuvin, informându-ne. Totodată, în situația în care identificați suprafețe infestate asupra cărora nu aveți dreptul să acționați, vă rugăm să ne înștiințați în vederea aplicării cît mai rapide a măsurilor de distrugere.